



Mount Saver

Technisches Bulletin & Anleitung

Über: Der Mount Medix Mount Saver ist unser Originalprodukt. Es wird speziell verwendet, um Passepartouts von schädlichen Insekten zu befreien. Mount Saver tötet Motten und Dermistiden in allen Formen ihres Lebenszyklus, einschließlich der Eier. Bei diesem Produkt handelt es sich um eine Taxidermie-Chemikalie, die speziell für diesen Zweck entwickelt wurde, im Gegensatz zu Haushalts- oder kommerziellen Pestiziden, die nicht für den Einsatz in der Taxidermie bestimmt sind und oft nur unzureichend die Insekteneier abtöten. Der aktive Wirkstoff in Mount Saver ist eine Mischung aus ätherischen Ölen, keine scharfe synthetische Chemikalie.

Was zu beachten ist:

Wenn Sie lose Haare, umherfliegende Motten, feines sandartiges Material unter Ihren Halterungen bemerken, haben Sie möglicherweise einen Insektenbefall. Schauen Sie genauer hin und spreizen Sie das Haar, um nach spinnwebenartiger Seide im Haar zu suchen, nach eingeschnittenen Kanälen im Haar, in denen Insekten gefüttert haben, nach winzigem hellbraunem, sandartigem Kotmaterial besonders auf Wandkontaktflächen, auf dem Boden unter dem Reittier oder auf dem Reittierhabitat. Spezifische Bereiche auf dem Reittier, auf die Sie sich bei der Inspektion konzentrieren sollten, wären die Fressschlitze, um die Ohren, das Geweih und das Horn, sowie an den Pfoten und um die Hufe.

Anwendungen:

Professionelle oder kundenspezifische Verwendung

1. Wenn Sie mehr als 0,5 Liter dieses Produkts verwenden, tun Sie dies in einem gut belüfteten Außenbereich, entfernt von Wohnräumen. Obwohl Mount Saver ein rein natürliches Produkt ist, können manche Menschen empfindlich auf das Produkt reagieren. Anwender sollten sich dessen bewusst sein und ihre Kunden konsultieren, bevor sie Mount Saver in einer geschlossenen Umgebung wie einem Trophäenraum oder in Innenräumen anwenden.

2. Beginnen Sie mit dem Absaugen oder dem Entfernen loser Verschmutzungen mit Druckluft. Mount Saver wird direkt auf das Reittier aufgetragen und gründlich

eingeweicht. Wenn möglich, ist es vorteilhaft, das Reittier auf den Kopf zu stellen, damit das Produkt an den Haaren entlang in das Fell läuft, anstatt an den Haaren entlang auf den Boden. Denken Sie daran, dass der Mount Saver an die Schnittstelle von Haar und Haut am Follikel gelangen muss. Dort leben die Insekten. Besondere Aufmerksamkeit muss auch den Falzschlitzen, den Brustbereichen, um die Ohren, Hörner und Geweihe, sowie den Bereichen des Reittiers, die die Wand berühren, gewidmet werden. Bei starkem Befall kann es sinnvoll sein, das Passepartout in Plastik zu wickeln oder für 2-8 Stunden in eine Plastiktüte zu legen.

3. Tragen Sie Mount Saver großzügig auf das Tier auf und stellen Sie sicher, dass alle Haare, Federn, Hautbereiche und alle Oberflächen des Passepartouts gründlich benetzt sind. Dies kann durch direktes Gießen von Mount Saver auf das Passepartout geschehen, ist aber am besten mit einem Sprühgerät zu bewerkstelligen. Für einige Anwendungen kann ein Abzugssprühgerät verwendet werden, aber für große Anwendungen wird ein kompatibles Pumpensprühgerät die Arbeit wesentlich einfacher machen.

4. Arbeiten Sie Mount Saver-Lösung manuell in das Reittier ein, falls erforderlich. Das manuelle Einarbeiten von Mount Saver über die Haare oder Federn hinaus bis in die Dermis ist wichtig für einen effektiven Kontakt mit dem Befall. Direkter Kontakt tötet die Insekten in weniger als einer Minute ab. Die Insekten ernähren sich an der Schnittstelle zwischen dem Haar und der Haut. Es kann notwendig sein, die Haare zu verteilen (questionable translation), um sicherzustellen, dass Mount Saver mit den befallenen Bereichen in Kontakt kommt.

5. Lassen Sie die Lösung aus dem Präparat ablaufen und wischen Sie den Überschuss ab. Das Aufsammeln des überschüssigen Produkts ist eine gute Idee. Es reduziert die Belastung der Umwelt und hält den Arbeitsbereich sicher und sauber. Wenn Sie die Mount Saver-Lösung aus einem Konzentrat herstellen, kann das zurückgewonnene Produkt durch einen Farbfiler gefiltert und als Verdünnungsmittel für die nächste Chargeanstelle von Wasser verwendet werden.

1. 6. Wenn Sie nicht sicher sind, dass eine vollständige Sättigung erreicht wurde, decken Sie das Präparat mit einem Polyethylenbeutel oder einer Polyethylenfolie ab und lassen Sie es 4 Stunden lang stehen. Die Verwendung von Plastikfolie oder Begasungsbeuteln wird für mittelgroße bis große Präparate und alle langhaarigen Arten empfohlen. Wenn die Rehydrierung ein Anliegen ist, verwenden Sie die angegebenen Zeiten. Studien haben gezeigt, dass Insekten innerhalb von vier Stunden nach Einwirkung der Dämpfe absterben. Wenn die Rehydrierung jedoch kein Problem darstellt, sind längere Einwirkzeiten bei der Arbeit mit dichtem Haar oder Fell von Vorteil. Während der Produktevaluierung wurden bestimmte Präparate länger als 24 Stunden eingewickelt. Unterschiedliche Präparationsverfahren lassen möglicherweise keine längeren Wickelzeiten zu; Klebertypen, Verschlussstechniken für das Fell und Puppenarten (questionable translation) werden bei der Bewertung (questionable translation) der Wickelzeit berücksichtigt.

7. Entfernen Sie die Verpackung und lassen Sie die Halterung trocknen. Dies kann mit Lüftern oder Föns beschleunigt werden.

8. Wiederholen Sie Schritt 2, um alle verbleibenden Ablagerungen und abgelaufenen Insekten, Larven oder Eier zu entfernen.

9. Führen Sie alle erforderlichen Reparaturen durch und überholen Sie das Gerät, falls gewünscht. Dies ist auch eine gute Gelegenheit, zusätzliche Lack- oder Epoxidharzreparaturen vorzunehmen, falls erforderlich.

10. Haare fusseln und kämmen oder Federn sträuben. Befallene Reittiere, die mit Mount Saver behandelt wurden, haben

einen angenehmen minzartigen Geruch und einen wiederhergestellten natürlichen Glanz.

Hinweis: Wenn eine "IN PLACE"-Anwendung erforderlich ist, legen Sie saugfähiges Material über eine Plastikplane, um Overspray/überschüssige Lösung aufzufangen. Reduzieren Sie alternativ die Anwendungsmenge, um das Haar auf ein erträgliches Maß zu befeuchten, und verlängern Sie die Wickeldauer auf zwei oder mehr Tage; eine gewisse Raumbelüftung wird erforderlich sein.

Vorsicht! Achten Sie darauf, dass die Haut nicht vollständig durchnässt oder rehydriert wird, da sich dadurch der Leim lösen und Trommelbildung verursachen kann. Machen Sie die Haut Ihres Passepartouts NIEMALS nass und setzen Sie ein nasses Passepartout niemals direktem Sonnenlicht aus, da dies zu einem starken Schrumpfen der Haut führen kann.

Verfügbare Größen und Verwendung: Der Mount Medix Mount Saver ist in den Größen 0,946-Liter- und 3,78-Liter-Flaschen gebrauchsfertig mit beiliegendem Zerstäuber sowie in 0,946-Liter- und 3,78-Liter-Flaschen Konzentrat erhältlich.

Materialverbrauch: Ein durchschnittlicher Schwarzbär in Lebensgröße benötigt 2-3 Liter für die Behandlung. Ein typischer schulterhoher Damhirsch benötigt etwa 120 - 240 ml (1,2 - 2,4 dl). Es kann auch notwendig sein, Habitatbereiche auf Befall zu behandeln. **NB: Bitte prüfen Sie vor der Anwendung die Verträglichkeit des Produkts mit dem Lebensraum.** Für empfindliche Tiere, die feines Haar oder Federn haben, empfehlen wir die Verwendung von ProAd.

Lagerfähigkeit: Größer als 5 Jahre

Für weitere Informationen oder Fragen wenden Sie sich bitte an Mount Medix LLC unter info@mountmedix.eu.