



Mount Saver

Boletín técnico e instrucciones

Acerca de: El Mount Medix Mount Saver es nuestro producto original. Se utiliza específicamente para librar a las monturas de los insectos dañinos. El Mount Saver matará a las polillas y a los dermíptidos en todas las formas de su ciclo de vida, incluidos los huevos. Este producto es un producto químico para taxidermia diseñado específicamente para este fin, a diferencia de los pesticidas domésticos o comerciales que no están pensados para su uso en taxidermia y que a menudo no consiguen matar los huevos de los insectos. El ingrediente activo de Mount Saver es una mezcla de aceites esenciales, no un producto químico sintético agresivo.

Lo que hay que buscar:

Si observa que el pelo está suelto, que hay polillas volando y que hay un material fino parecido a la arena debajo de sus monturas, es posible que tenga una infestación de insectos. Mire más de cerca y extienda el pelo para buscar telas de araña en el pelo, canales cortados en el pelo donde los insectos se han alimentado, material fecal diminuto parecido a la arena, especialmente en las superficies de contacto con la pared, en el suelo bajo la montura o en el hábitat de la montura. Las zonas específicas de la montura en las que se debe centrar la inspección son las ranuras de las orejas, los cuernos y la cornamenta, y las patas y los cascos.

Aplicaciones:

Uso profesional o del cliente

1. Si utiliza más de 0,5 litros de este producto, hágalo en una zona exterior bien ventilada y alejada de la vivienda. Aunque Mount Saver es totalmente natural, algunas personas pueden ser sensibles al producto. Se advierte a los aplicadores que sean conscientes de ello y que consulten a sus clientes antes de aplicar Mount Saver en un entorno cerrado, como una sala de trofeos o en interiores.

2. Empiece por aspirar o eliminar los restos sueltos con aire comprimido. 3. El Mount Saver se aplica directamente a la montura en un remojo completo. Si es posible, es beneficioso dar la vuelta a la montura para que el producto corra a lo

largo del pelo hacia la piel, en lugar de a lo largo del pelo hacia el suelo. Tenga en cuenta que Mount Saver debe llegar a la interfaz del pelo y la piel en el folículo. Ahí es donde viven los insectos. También hay que prestar especial atención a las ranuras de la piel, las zonas del pecho, alrededor de las orejas, los cuernos y las astas, y las zonas de la montura que están en contacto con la pared. En casos de infestación severa, puede ser beneficioso envolver la montura en plástico o colocarla en una bolsa de plástico durante 2-8 horas.

3. Aplique generosamente la solución Mount Saver al animal asegurándose de mojar bien todo el pelo, las plumas, las zonas de la piel y todas las superficies de la montura según corresponda. Esto puede lograrse vertiendo directamente Mount Saver sobre la montura, pero se logra mejor con el uso de un pulverizador. Para algunas aplicaciones, se puede utilizar un pulverizador de gatillo, pero para aplicaciones grandes un pulverizador de bomba compatible hará el trabajo mucho más fácil.

4. Trabaje manualmente la solución Mount Saver en la montura si es necesario. Trabajar manualmente Mount Saver más allá del pelo o las plumas hasta la dermis es importante para un contacto efectivo con la infestación. El contacto directo matará a los insectos en menos de un minuto. Los insectos se alimentan en la interfaz entre el pelo y la piel. Puede ser necesario extender el pelo para asegurar que Mount Saver haga contacto con las zonas infestadas.

5. Deje que la solución escurra de la montura de taxidermia y pase un paño para eliminar el exceso. Recoger el exceso de producto es una buena idea. Reduce nuestro impacto en el medio ambiente y mantiene la zona de trabajo segura y ordenada. Si se hace la solución Mount Saver a partir de concentrado, el producto recuperado puede filtrarse a través de un filtro de pintura y utilizarse como diluyente para el siguiente lote en lugar de agua.

1. 6. Si no está seguro de que se ha logrado la saturación total, cubra la montura de taxidermia con una bolsa de polietileno o una envoltura de lámina de polietileno y déjela reposar durante 4 horas. Se recomienda el uso de envolturas de plástico o bolsas de fumigación para montajes de tamaño natural mediano o grande y para cualquier especie de pelo largo. Si la rehidratación es una preocupación, utilice los tiempos indicados. Los estudios han demostrado que los insectos mueren a las cuatro horas de la exposición a los vapores. Sin embargo, si la rehidratación no es un problema, los tiempos de exposición más largos son beneficiosos cuando se trabaja con pelo denso o pelaje. Durante la evaluación del producto, algunos montajes se mantuvieron envueltos más de 24 horas. Las diferentes técnicas de taxidermia pueden no permitir tiempos de envoltura más largos; los tipos de cola, las técnicas de cierre de las pieles y los tipos de maniqués son factores que se tienen en cuenta a la hora de evaluar el tiempo de envoltura.

7. Retire el envoltorio y deje que el soporte se seque. Esto puede acelerarse con ventiladores o secadores.

8. Repita el paso 2 para eliminar los restos y los insectos, larvas o huevos caducados.

9. Realice todas las reparaciones necesarias y reacondicione, si lo desea. Esta es también una buena oportunidad para hacer cualquier reparación adicional de pintura o epoxi, donde sea necesario.

10. Esponjar y peinar el pelo o acicalar las plumas. Las monturas infestadas tratadas con Mount Saver tendrán

un agradable olor a menta, y un brillo natural restaurado.

Nota: Si se requiere una aplicación "IN PLACE", coloque un material absorbente sobre una lona de plástico para recoger el exceso de pulverización/solución. Alternativamente, reduzca las cantidades de uso para humedecer el cabello a lo que sea tolerable y aumente la duración de la envoltura a dos o más días; será necesaria cierta ventilación de la habitación.

Precaución: Hay que tener cuidado para evitar empapar o rehidratar completamente la piel, ya que esto puede aflojar el pegamento y provocar el tamborileo. NUNCA moje la piel de su montura o esponja una montura mojada a la luz directa del sol, ya que esto puede causar una severa contracción de la piel.

Tamaños disponibles y uso: El Mount Medix Mount Saver está disponible en tamaños de botellas de 0,946 litros y 3,78 litros listas para usar con el pulverizador que las acompaña, así como en botellas de 0,946 litros y 3,78 litros de concentrado.

Uso del material: Un oso negro de tamaño medio requerirá 2-3 litros para el tratamiento. Un gamo típico montado en el hombro requerirá unos 120 - 240 ml (1,2 - 2,4 dl). También puede ser necesario tratar las zonas del hábitat para la infestación. **NB: Compruebe la compatibilidad del producto con el hábitat antes de la aplicación.** Para aquellas monturas que son delicadas, tienen pelo fino o plumas recomendamos el uso de ProAd.

Vida útil: Más de 5 años

Para más información o preguntas, póngase en contacto con Mount Medix LLC en info@mountmedix.eu